

## Perbedaan letak kondilus sendi temporo - mandibula pada kasus disfungsi dengan gejala dan tanpa gejala keletuk sendi dilihat secara radiografik

Rianti Surjanto, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20471585&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

**ABSTRAK**

Keletuk sendi merupakan gejala klinis yang banyak dijumpai pada penderita disfungsi sendi temporo-mandibula.

Radiografi merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi letak kondilus sendi temporo-mandibula. Pada penelitian ini, digunakan proyeksi transkraniial miring lateral superior dengan menggunakan condy-ray. Foto rontgen yang didapat diperbesar 4x, kemudian dibuat tracing. Pada hasil tracing dilakukan pengukuran.

Dari penelitian pada 30 pasien dengan gejala keletuk sendi terlihat posisi kondilus kanan atau kiri adalah non konsentris dan kemungkinan pergeseran posisi kondilus kanan atau kiri ke arah anterior atau posterior adalah sama (Chi kuadrat p kurang dari 0,05)

Hasil yang didapat dari penelitian ini, menunjukkan adanya perbedaan letak kondilus pada kasus disfungsi dengan dan tanpa gejala keletuk sendi (uji fisher p kurang dari 0,05).