

Hubungan komunikasi terapeutik perawat dengan tingkat nyeri pasien post operasi laparotomi di Siloam Hospitals = Correlation between nursing therapeutic communication with levels of pain in patients post laparotomy at Siloam Hospitals

Baso Yulistir, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20474172&lokasi=lokal>

Abstrak

Nyeri merupakan masalah utama pada pasien post operasi laparotomi. Penatalaksanaan nyeri non farmakologi dapat dilakukan dengan menggunakan komunikasi terapeutik yang baik. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan komunikasi terapeutik perawat dengan tingkat nyeri pada pasien post operasi laparotomi. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional pada 76 pasien post operasi laparotomi yang diambil dengan cara purposive sampling.

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara komunikasi terapeutik perawat dengan tingkat nyeri pada pasien post operasi laparotomi $p=0,002$. Semakin baik kemampuan komunikasi terapeutik perawat maka akan menurunkan tingkat nyeri pada pasien post operasi laparotomi. Rekomendasi penelitian ini, sebagai tambahan pengetahuan bagi perawat khususnya terkait komunikasi terapeutik dan tingkat nyeri pada pasien post operasi laparotomi dengan cara melakukan evaluasi dan pelatihan bagi perawat terkait komunikasi terapeutik.

.....Pain is the main problem in patients post operation laparotomi. Non pharmacological pain management can be done with using a good therapeutic communication. The purpose of this research was to know the correlation between therapeutic communication with pain levels in patients post laparotomi. This research uses descriptive analytic design with cross sectional approach on 76 patients post laparotomy taken by means of purposive sampling.

The results has shown that was any correlation between therapeutic communication with pain levels in patients post operation laparotomi $p 0.002$. It means that a good therapeutic communication skill will decrease the level of pain in patients post laparotomi. The recommendations of this study will improve the knowledge of nurses especially therapeutic communication and related pain levels in patients post laparotomy by way of doing evaluation and training for nurse related therapeutic communication.