

# Gambaran kepatuhan diit pada pasien diabetes mellitus tipe II di poli diabetes RS. dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor = The description of diet adherence in outpatient clinic diabetes mellitus type II dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Hospital

R. Akmalul Fikri Abdi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20474679&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Diabetes Mellitus tipe II memiliki penatalaksanaan yang terdiri dari : Edukasi, Terapi Nutrisi Medis, Latihan Jasmani, Terapi Farmakologis, dan Monitor Kadar Gula Darah. Komplikasi diabetes mellitus tipe II dapat disebabkan oleh ketidakpatuhan terapi nutrisi medis atau diit. Sebagian besar pasien diabetes mellitus tipe II patuh terhadap rekomendasi diit hanya selama 6 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kepatuhan diit pada pasien diabetes mellitus tipe II di poli diabetes Rumah Sakit doktor Haji Marzoeki Mahdi Bogor dengan berdasarkan aspek patuh jadwal, patuh jenis, dan patuh jumlah. Desain penelitian ini menggunakan cross sectional dengan metode consecutive sampling yang melibatkan 109 responden. Hasil penelitian didapatkan sebagian besar responden tidak patuh terhadap diit terutama patuh jumlah.

Rekomendasi penelitian ini adalah melakukan penelitian lanjutan mengenai faktor non-dash; faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan diit terhadap jumlah.

.....

Diabetes Mellitus type II has a management consisting of Education, Medical Nutrition Therapy, Physical Exercise, Pharmacological Therapy, and Blood Sugar Level Monitor. Diabetes mellitus type II complications can be caused by non adherence to medical nutrition therapy or dietary planning. Most of diabetes mellitus type II patients adhere to dietary recommendations only for 6 months. This study aimed to describe the dietary adherence in outpatient clinic diabetes mellitus type II Doctor Haji Marzoeki Mahdi Bogor hospital based on the schedule, type, and amount of food. The design of this study used cross sectional with consecutive sampling method involving 109 respondents. The result of this study shows that most of respondent has non adherence to diet especially adherence of food amount. The recommendation of this study is to conduct further research on the factors that influence non adherence of food amount.