

# Analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kualitas hidup pasien kusta yang mengalami kecacatan di Rumah Sakit Kusta dr. Sitanala Tangerang = Factors related to the quality of life of leprosy patients with disabilities at Leprosy Hospital dr. Sitanala Tangerang

Destiawan Eko Utomo, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20476195&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Penyakit kusta merupakan salah satu dari delapan penyakit terabaikan atau Neglected Tropical Disease (NTD) yang masih ada di Indonesia. Beban akibat penyakit kusta bukan hanya karena masih tingginya jumlah kasus yang ditemukan tetapi juga kecacatan dan kualitas hidup yang diakibatkannya. Bertujuan untuk mengidentifikasi tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kualitas hidup pada pasien kusta yang mengalami kecacatan di Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Kota Tangerang. Penelitian kuantitatif non eksperimental menggunakan desain cross-sectional. Dengan besar sampel yang digunakan adalah 96 responden. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan secara signifikan antara umur ( $p = 0,253$ ), jenis kelamin ( $p = 1,000$ ), pendidikan ( $p = 1,000$ ), penghasilan ( $p = 1,000$ ), tingkat kecacatan ( $p = 0,397$ ), proses penyakit ( $p = 1,000$ ), Pengetahuan ( $p = 0,626$ ), stigma ( $p = 0,955$ ) dengan kualitas hidup. Ada hubungan yang signifikan antara keterbatasan aktivitas fungsional ( $p = 0,002$ ), coping ( $p = 0,006$ ) dan dukungan sosial ( $p = 0,002$ ) terhadap kualitas hidup. Faktor yang paling dominan berhubungan dengan kualitas hidup adalah keterbatasan aktivitas fungsional. Penyusunan standar asuhan keperawatan pasien kusta yang mengalami kecacatan diharapkan mempertimbangkan keterbatasan fungsional, coping individu dan dukungan sosial.

.....Leprosy is one of the eight neglected tropical diseases (NTD) that still exist in Indonesia. Although the disability rate declines but the impact on quality of life remains. The purpose of this study was to explain the factors related to quality of life in leprosy patients with disabilities in Leprosy Hospital Dr Sitanala Kota Tangerang. The method of this research is non-experimental quantitative method and cross-sectional study design. The sample was 96 respondents of leprosy patients with disability.

The results showed no significant relation age ( $p = 0.253$ ), sex ( $p = 1,000$ ), education ( $p = 1,000$ ), income ( $p = 1,000$ ), disability rate ( $p = 0.397$ ), disease process ( $p = 1,000$ ), knowledge ( $p = 0.626$ ), stigma ( $p = 0.955$ ) on quality of life. There are significant relationship among functional activity limitations ( $p = 0.002$ ), coping ( $p = 0.006$ ) and social support ( $p = 0.002$ ) on quality of life. Conclusion: There are relationship between the limitations of functional activity, individual coping and social support with quality of life. Implication standard care should involved disability, limited functional, coping and social support.