

Analisis asuhan keperawatan ansietas pada klien post operasi dengan tuberkulosis usus = Analysis of anxiety nursing care on post client tuberculosis intestine at Marzoeki Mahdi hospital

Siska Susdia Lestari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20479317&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk pada wilayah perkotaan mengakibatkan munculnya wabah penyakit menular di daerah perkotaan. Penyakit menular terjadi karena sanitasi yang buruk sehingga menjadi media penularan yang baik bagi kuman terutama tuberkulosis TB . Prognosis yang buruk dan intervensi bedah pada kasus TB usus mengakibatkan timbulnya masalah psikososial ansietas. Ansietas adalah kondisi kejiwaan berupa timbulnya perasaan gelisah, takut, atau pikiran dan firasat buruk. Diagnosa keperawatan ansietas dirumuskan berdasarkan hasil pengkajian meliputi pemeriksaan fisik, wawancara, dan observasi. Metode dalam penulisan ini yaitu menggunakan studi kasus. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis asuhan keperawatan ansietas pada klien post operasi dengan tb usus. Hasil yang didapatkan setelah empat hari perawatan yaitu terdapat penurunan tingkat ansietas yang diukur dengan skala Hamilton Anxiety Rating Scale HARS dari skor 20 menjadi 7 setelah dilakukan latihan teknik relaksasi nafas dalam, distraksi, spiritual, dan hipnosis lima jari. Karya ilmiah selanjutnya diharapkan dapat menganalisis asuhan keperawatan psikososial ketidakberdayaan pada kasus TB usus.

<hr>

ABSTRACT

Population growth in urban areas resulted in a dense environment causing outbreak of infectious diseases in urban areas. Infectious diseases occur due to poor sanitation that become a good medium of transmission for germs, especially tuberculosis TB . Unsatisfied prognosis and surgical inrevention due to intestinal tuberculosis cases can lead to the emergence of anxiety psychosocial problems. Anxiety is a psychiatric condition in the form of anxiety, fear, or bad thought and premonitions. An anxiety nursing diagnosis was formulated based on the result of the assesment including physical examination, interview, and observation. The method in this paper is using case studies. The purpose of this paper is analyzes nursing care about anxiety in postoperative clients with intestinal tract. The results obtained after four days of treatment were decreased anxiety levels measured by the Hamilton Anxiety Rating Scale HARS scale from a score of 20 to 7 after deep breathing relaxation exercises, distraction, spiritual, and five finger hypnosis. The next scientific work is expected to analyze psychosocial nursing powerless in cases of intestinal TB.