

## Hubungan perubahan kadar elektrolit dan pH serum pasien dengan balans cairan positif yang diterapi furosemid dan tanpa furosemid di ICU = The effects of furosemide usage in blood electrolyte and pH of critically ill patient with positive fluid balance

Fadlika Harinda, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20481516&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

#### <b>ABSTRACT</b><br>

Pasien rawat inap ICU sering ditemui dengan keadaan balans cairan akumatif positif. Hal ini dapat menjadi penanda biologis sekaligus faktor risiko perburukan gagal fungsi organ dan kematian. Untuk itu, koreksi balans cairan utamanya pada pasien dengan urin output berkurang diperlukan. Furosemid merupakan agen diuretik pilihan. Akan tetapi, furosemid dapat menyebabkan abnormalitas elektrolit. Atas dasar itu, dilakukan studi analisis komparatif antara perubahan kadar elektrolit dan pH serum terhadap penggunaan furosemid pada pasien balans cairan akumulatif positif di ICU. Dengan desain penelitian kohort retrospektif, diperoleh 222 sampel rekam medik RSCM melalui metode consecutive sampling. Data penggunaan furosemid dan perubahan kadar elektrolit dan pH serum dimasukkan dalam tabel kemudian dianalisis menggunakan uji T tidak berpasangan. Hasil menunjukkan tidak terdapat perbedaan bermakna pada perubahan kadar elektrolit dan pH serum dengan penggunaan furosemid pada pasien balans positif di ICU ( $p > 0,05$ ). Furosemid dapat menyebabkan penurunan kadar elektrolit dan fluktuasi pH pada pengukuran 0, 24, 48, dan 72 jam pasca pemberian. Hal ini dapat terjadi akibat adanya mekanisme kompensasi tubuh terhadap retensi  $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{Cl}^-$  pada urin yang terjadi sebagai efek kerja dari furosemid. Hal ini kemudian dikompensasi dengan retensi  $\text{H}^+$  yang menyebabkan fluktuasi pada pH. Meskipun demikian, perubahan-perubahan yang terjadi secara statistik tidak berbeda bermakna. ICU

<hr>

#### <b>ABSTRACT</b><br>

hospitalized patients are often found with positive accumulative fluid balances. This can be a biological marker as well as a risk factor for worsening organ function failure and death so that correction of fluid balance is necessary. However, as one of preferred diuretic agent, furosemide can cause electrolyte abnormalities. This retrospective cohort study was carried out to analyze difference between serum electrolyte levels and pH changes prior to furosemide usage in patients with positive accumulative fluid balance in intensive care. Data collected from 222 medical records in Cipto Mangunkusumo Hospital obtained by consecutive sampling. The use of furosemide and changes in serum electrolyte levels and pH data were analyzed using independent T-test. The results show that there are no significance differences between serum electrolyte levels and pH changes prior to furosemide usage ( $p > 0.05$ ). A decrease in electrolyte levels on 0, 24, 48, and 72 hours after furosemide use measurements can occur due to body's compensation mechanism for urinary  $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{Cl}^-$  retention as main effect of furosemide. This plasma electrolyte repletion is compensated by plasma  $\text{H}^+$  retention and the fluctuation of pH occurred. Even so, changes that occur statistically have no significance.