

Pengaruh Elevasi 20 Derajat Terhadap Pembengkakan dan Tingkat Nyeri Pada Pasien Pascabedah Open Reduction and Internal Fixation Ekstremitas Bawah = Effect of 20 Degrees Elevation on Swelling and Pain Levels in Postoperative Patients with Open Reduction and Internal Fixation in Lower Extremity

Eni Purwanty, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20490769&lokasi=lokal>

Abstrak

Pembedahan *Open Reduction and Internal Fixation* menimbulkan pembengkakan jaringan dan nyeri hebat pada area pembedahan. Salah satu upaya nonfarmakologis mengurangi pembengkakan dan nyeri adalah melakukan elevasi bagian distal yang dilakukan pembedahan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh elevasi 20 derajat terhadap pembengkakan dan tingkat nyeri pada pasien pascabedah *Open Reduction and Internal Fixation* ekstremitas bawah. Penelitian dilakukan dengan desain *quasi eksperimental* rancangan *two group pretest-posttest with control group* dengan subyek penelitian sebanyak 34 responden yang dibagi menjadi kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Pengukuran *circumference* pembengkakan menggunakan pita meter dan tingkat nyeri dengan skala *Numeric Rating Scale*. Penggunaan uji statistik dengan uji T dependen, uji T independent dan korelasi Pearson. Hasil penelitian terdapat perbedaan yang signifikan selisih rerata penurunan *circumference* pembengkakan sebesar 1,93 cm dan tingkat nyeri sebesar 1,29 antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Elevasi 20 derajat ekstremitas bawah dapat menjadi alternatif tindakan keperawatan mandiri dalam menurunkan pembengkakan dan nyeri.

Surgery for Open Reduction and Internal Fixation causes tissue swelling and severe pain in the surgical area. One nonpharmacological effort to reduce swelling and pain is to perform distal elevation in the area of surgical. The purpose of this study was to determine the effect of a 20 degrees elevation on swelling and the level of pain in patients after surgery for Open Reduction and Internal Fixation of the lower extremities. The study with a quasi-experimental design of two group pre-test and post-test with control group with 34 subjects was divided into intervention and control groups. Swelling circumference measurements using tape meters and the level of pain with the scale of the Numeric Rating Scale. This study used dependent T test, independent T test and Pearson correlation. The results of the study showed that there were significant differences in the mean difference in the swelling circumference of 1.93 cm and the pain level of 1.29 between the intervention group and the control group. Elevation of 20 degrees of lower extremity can be an alternative for nursing intervention in reducing swelling and pain