

Hubungan pasangan seks multipel dengan perilaku penggunaan kondom pada kelompok lelaki seks dengan lelaki (LSL) di 5 kota besar di Indonesia tahun 2015 = The association between multiple sex partners with condom use behavior in MSM Groups in 5 big cities of Indonesia in 2015 / Ni Wayan Putri Larassita Parwangsa

Ni Wayan Putri Larassita Parwangsa, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20492858&lokasi=lokal>

---

Abstrak

<p>ABSTRAK<br />Nama : Ni Wayan Putri Larassita Parwangsa<br />Program Studi : Epidemiologi<br />Judul : Hubungan Pasangan Seks Multipel dengan Perilaku Penggunaan Kondom pada Kelompok LSL di 5 Kota Besar di Indonesia Tahun 2015<br />Pembimbing : Dr. dr. Krisnawati Bantas, M.Kes.<br />Pendahuluan : Sebagian besar LSL merupakan orang-orang yang menjalankan prinsip hidup bebas dimana 88% gaya seksual pada LSL tidak aman yaitu memiliki pasangan seks multipel. Kecenderungan perilaku seksual berisiko dengan banyak pasangan yang dilakukan oleh kelompok LSL ini dapat dikaitkan dengan perilaku penggunaan kondom secara konsisten dalam rangka pencegahan penularan HIV dan IMS pada kelompok LSL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Pasangan Seks Multipel dengan Perilaku Penggunaan Kondom pada kelompok LSL di 5 Kota Besar di Indonesia tahun 2015.<br />Metodologi : Penelitian ini menggunakan cross sectional design. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di 5 Kota Besar di Indonesia yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Denpasar dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari data Survey Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) pada tahun 2015. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi LSL yang tidak konsisten menggunakan kondom di 5 Kota Besar di Indonesia tahun 2015 yaitu sebesar 67,55%, proporsi LSL yang memiliki pasangan seks multipel yaitu sebesar 83,80%, dan pasangan seks multipel memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku penggunaan kondom dengan nilai PR sebesar 1,571 (95% CI 1,171 &ndash; 2,108) setelah dikontrol variabel riwayat IMS.<br />Kesimpulan : Kesimpulan dari penelitian ini yaitu LSL yang memiliki pasangan seks multipel berisiko 1,571 kali lebih besar untuk berperilaku tidak konsisten dalam menggunakan kondom dibandingkan dengan LSL yang tidak memiliki pasangan seks multipel setelah dikontrol variabel riwayat IMS.<br />Kata Kunci : HIV&amp;AIDS, Kondom, Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL), Pasangan Seks Multipel, Perilaku Penggunaan Kondom</p><hr /><p>ABSTRACT<br />Name : Ni Wayan Putri Larassita Parwangsa<br />Study Program : Epidemiologi<br />Title : The Association between Multiple Sex Partners with Condom Use Behavior in MSM Groups in 5 Big Cities of Indonesia in 2015<br />Counsellor : Dr. dr. Krisnawati Bantas, M.Kes.<br />Background : Most MSM are people who live the principle of free life where 88% of sexual styles in MSM are unsafe, namely having multiple sex partners. The tendency of risky sexual partners with multiple partners conducted by MSM groups can be associated with consistent behavior of condom use in the context of preventing HIV and STI transmission in MSM groups. This study aims to find out the relationship of Multiple Sex Couples with Condom Use Behavior in MSM groups in 5 Big Cities in Indonesia in 2015.<br />Methods : This study used a cross sectional design. The location of this study was carried out in 5 major cities in Indonesia, namely Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, and Denpasar using secondary data. Secondary data in this study were obtained from data from the Biological and Behavior Integrated Survey (STBP) in 2015.<br />Results : The results showed

that the proportion of MSM who were inconsistent in using condoms in 5 big cities in Indonesia in 2015 was 67.55%, the proportion of MSM who had multiple sex partners were 83.80%, and multiple sex partners had a significant relationship with condom use behavior with a PR value of 1.571 (95% CI 1.171 - 2.108) after being controlled by STI History.

Conclusion : The conclusion of this study is that MSM who have multiple sex partners have a risk of 1.571 times greater behavior that is not consistent in using condoms compared with MSM who do not have multiple sex partners after being controlled by STI History.

Keywords: Condoms, Condom Use Behavior, HIV&AIDS, Men Sex with Men (MSM), Multiple Sex Partners