

# Analisis Farmakokinetik Nanopartikel Kitosan-Alginat Mangiferin dan distribusinya di Jantung dan Hati Tikus Sprague-Dawley = Pharmacokinetic Analysis of Chitosan-Alginate Mangiferin Nanoparticles and Their Distribution in The Heart and Liver of Sprague-Dawley Rat.

Devi Maulina, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20493855&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

### <b>ABSTRAK</b><br>

Mangiferin merupakan salah satu senyawa derivat xanton yaitu C-glikosilxanton yang berpotensi dikembangkan menjadi agen pengkelat besi namun bioavailabilitas pada pemberian secara oral sangat rendah dan kelarutannya kurang baik. Preparasi mangiferin dalam nanopartikel kitosan-alginat diharapkan dapat meningkatkan bioavailabilitas mangiferin karena dengan memperkecil ukuran mangiferin akan memperbesar luas permukaan dan meningkatkan interaksi dengan pelarut sehingga kelarutan akan meningkat. Nanopartikel juga dapat menghantarkan senyawa obat dengan baik sampai ke unit-unit kecil dalam tubuh, meningkatkan distribusi, serta obat tepat target, sehingga meningkatkan efek terapeutik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai parameter farmakokinetik nanopartikel kitosan-alginat mangiferin yang diberikan secara oral pada tikus. Penelitian dilakukan pada tikus jantan Sprague-Dawley yang diberi nanopartikel kitosan-alginat mangiferin sebesar 50 mg/kgBB secara oral. Darah diambil dari vena ekor pada 0; ½; 1; 2; 3; 4; 4½; 5; 5½ dan 6 jam setelah pemberian oral. Hati dan jantung diambil pada jam ke 4 dan 6 setelah pemberian oral. Analisis kadar mangiferin pada plasma, hati dan jantung menggunakan HPLC. Parameter farmakokinetik telah dihitung. Konsentrasi maksimum nanopartikel kitosan-alginat mangiferin dalam plasma mencapai  $634,65 \pm 10,37$  ng/mL dengan Tmax 4 jam setelah pemberian oral dan waktu paruh eliminasi ( $t_{1/2}$ ) adalah  $6,45 \pm 0,15$  jam. Konsentrasi nanopartikel kitosan-alginat mangiferin di jantung dan di hati pada jam keempat dan keenam setelah pemberian oral berturut-turut adalah  $753,16 \pm 93,48$  ng/mL,  $1976,55 \pm 40,06$  ng/mL,  $1998,81 \pm 72,25$  ng/mL, dan  $3562,81 \pm 189,28$  ng/mL. Peningkatan kadar mangiferin pada kelompok nanopartikel kitosan-alginat mangiferin di plasma, jantung dan hati menunjukkan bentuk nanopartikel kitosan-alginat mangiferin memiliki absorpsi yang lebih baik dibanding kelompok mangiferin. Preparasi nanopartikel kitosan-alginat mangiferin dapat mempengaruhi profil farmakokinetik mangiferin pada plasma dan distribusinya pada hati dan jantung tikus.

<hr>

### <b>ABSTRACT</b><br>

Mangiferin is one of the xanthone derivative compounds, namely C-glycosylxanthenes which has the potential to be developed into an iron chelating agent but the bioavailability of oral administration is very low, and its have poor solubility. The preparation of mangiferin in chitosan-alginate nanoparticles are expected to increase the bioavailability of mangiferin because by reducing particle size it will increase the surface area and increase interaction with the solvent so that solubility will increase. Nanoparticles can also deliver medicinal compounds well to small units in the body, increase distribution, and target drugs, thereby increasing therapeutic effects. The purpose of this study was to determine the various pharmacokinetic parameters of chitosan-alginate mangiferin nanoparticles given orally in rats. The study was conducted on

Sprague-Dawley male rats were given 50 mg/ kgBW of chitosan-alginate mangiferin orally. Blood samples were taken from the tail vein at 0; ½; 1; 2; 3; 4; 4½; 5; 5½ and 6 hours after oral administration. Heart and liver organs are taken at the fourth and sixth hour after oral administration. Analysis of mangiferin levels in plasma, liver, and heart using HPLC. The pharmacokinetics parameters were calculated. The maximum concentration of chitosan-alginate mangiferin nanoparticles in plasma reached  $634.65 \pm 10.37$  ng/mL with  $T_{max}$  4 hours after oral administration, and the apparent elimination half-life ( $t_{1/2}$ ) was  $6.45 \pm 0.15$  hours. Concentrations in the heart and liver in the fourth and sixth hours after oral administration were  $753.16 \pm 93.48$  ng/mL,  $1976.55 \pm 40.06$  ng/mL,  $1998.81 \pm 72.25$  ng/mL, and  $3562.81 \pm 189.28$  ng/mL. Increased concentrations of chitosan-alginate mangiferin nanoparticles in plasma, heart, and liver showed that chitosan-alginate mangiferin nanoparticles had good absorption. Preparation of chitosan-alginate mangiferin nanoparticles can affect the pharmacokinetic profile of mangiferin in plasma and its distribution to the liver and heart of rats.