

# Analisis Asuhan Keperawatan Pada Pasien Dengan Efusi Pleura Dan Intervensi Posisi Semi Fowler di Ruang Perawatan Lantai 4 Selatan RSUP Fatmawati = Analysis of Nursing Care in Patients with Pleural Effusion and Intervention Semi Fowler Position in the 4th Floor Treatment Room of South Fatmawati Hospital

Jihaz Haneen Hakiki, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20496722&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Efusi pleura merupakan kondisi terkumpulnya cairan didalam rongga pleura yang dapat berupa cairan eksudat dan transudat. Efusi pleura terjadi karena komplikasi dari penyakit yang menyertai. Selain itu dapat disebabkan juga karena penyakit infeksi maupun dan non infeksi. Masalah yang umum muncul pada efusi pleura adalah sesak napas dikarenakan penurunan ekspansi paru sebagai akibat penumpukan cairan di rongga pleura. Masalah keperawatan yang dapat ditegakkan yaitu pola napas tidak efektif. Karya Ilmiah Akhir ini memberikan gambaran tentang keefektifan pemberian posisi <em>semi fowler </em>terhadap penurunan sesak napas pada Tn. S dengan efusi pleura. Hasil evaluasi yang dilakukan selama empat hari menunjukkan penurunan sesak napas dan penurunan penggunaan otot bantu pernapasan pada Tn. S setelah diberikan posisi <em>semi fowler. </em>Posisi <em>semi fowler </em>mampu menurunkan upaya penggunaan alat bantu otot pernapasan. Posisi <em>semi fowler</em> dapat direkomendasikan untuk memaksimalkan ekspansi paru dan penurunan upaya penggunaan alat bantu otot pernapasan.

<hr>

Pleural effusion is a condition of fluid accumulation in the pleural cavity which can be fluid exudate and transudate. Pleural effusion occurs because of complications from the accompanying disease. Besides that it is also caused by infectious and non-infectious diseases. A common problem in pleural effusion is shortness of breath due to decrease lung expansion as a result of accumulation of fluid in the pleural cavity. Nursing problems that can be enforced are ineffective breathing patterns. This paper provides an overview of the effectiveness of giving a semi fowler position to decrease shortness of breath in Mr. S pleural effusion. The results of semi fowler position intervention were decreasing in shortness of breath and in using of respiratory muscles in Mr. S. The semi fowler position is recommended to maximize lung expansion and to decrease the use of respiratory muscles.