

# Analisis rasio neutrofil-limfosit (NLR)/ratio sel darah putih-platelet (PWBR) sebagai prediktor kekambuhan pada pasien kanker payudara = Analysis of neutrophil-lymphocyte ratio (NLR)/white blood cell-platelet ratio (PWBR) as a predictor of recurrence in breast cancer patients

Mutiara Ramadhanty, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20500140&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Angka kejadian kanker payudara di Indonesia dan di dunia masih tinggi begitu pula dengan angka kekambuhan kanker payudara pada pasien yang telah menjalani pengobatan, saat ini diperlukan prediktor yang dapat dijadikan dasar untuk memperkirakan apakah kanker payudara dapat kambuh kembali setelah ditata laksana. Oleh karena itu penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan inter-rasio NLR/PWBR terhadap rekurensi kanker payudara apakah dapat dijadikan prediktor rekurensi kanker payudara. Penelitian dilakukan menggunakan metode cohort retrospektif minimal 3 bulan sampai 7 tahun dengan melihat rekam medis pasien kanker payudara yang telah mendapatkan terapi untuk mengambil data hasil pemeriksaan darah tepi. Selanjutnya data dianalisis menggunakan uji Chi-Square dengan program SPSS. Dari 106 sampel yang memenuhi kriteria seleksi, ditemukan 53 pasien dengan NLR/PWBR rendah dengan 23 kejadian rekurensi dan dari 53 pasien dengan NLR/PWBR tinggi dengan 13 kejadian rekurensi ( $RR=1,77$ , CI 95% 1,0070 – 3,1083,  $p=0,065$ ). Dari pasien dengan hormonal positif, ditemukan 21 kejadian rekurensi pada kelompok NLR/PWBR rendah, dan 9 kejadian rekurensi pada kelompok NLR/PWBR tinggi ( $RR=2,05$ , CI 95% =1,088 – 3,857,  $p=0,035$ ).

.....Incidence rates of breast cancer are still high in Indonesia and in the World. So as the rate of recurrence breast cancer in patients who have undergone treatment. Now needed predictor that can be used as a standard for estimating whether breast cancer can recur after treatment. This research was done to investigate the association between NLR/PWBR inter-ratio to breast cancer recurrence. This research was conducted using a retrospective cohort method by looking at the peripheral blood tests in medical records with minimal 3 months until maximal 7 years observation. The data were analyzed using the Chi Square test with the SPSS software. From 106 patients there were 53 patients with lower NLR/PWBR with 23 breast cancer recurrence, and from 53 patient with higher NLR/PWBR with 13 breast cancer recurrence ( $RR=1,77$ , CI 95% =1,0070 – 3,1083,  $p=0,065$ ). From patients with hormonal positive, there were 21 breast recurrence from lower NLR/PWBR, and 9 from higher NLR/PWBR ( $RR=2,05$ , CI 95% =1,088 – 3,857,  $p=0,035$ ).