

# Hubungan Psychological Distress dan Kepatuhan terhadap Pengobatan dengan Moderator Dukungan Sosial pada Pasien dan Penyintas Kanker Payudara = The Correlation of Psychological Distress and Adherence to Medical Treatment with Social Support as Moderator in Breast Cancer Patients and Survivors

Theresia Mustika Wahyu Hendrati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20504144&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Selama menjalani pengobatan kanker payudara, pasien dan penyintas rentan mengalami psychological distress yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan mereka dalam menjalani pengobatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hubungan psychological distress dan kepatuhan terhadap pengobatan dengan moderator dukungan sosial pada pasien dan penyintas kanker payudara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang melibatkan 129 pasien dan penyintas kanker payudara dari berbagai komunitas kanker payudara melalui teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa psychological distress berhubungan secara signifikan dengan kepatuhan terhadap pengobatan ( $t(127) = -4,722$ ,  $p < 0,05$ ), di mana 14,3% varians dari skor kepatuhan terhadap pengobatan dapat dijelaskan oleh psychological distress. Dukungan sosial secara signifikan berhubungan dengan kepatuhan terhadap pengobatan ( $t(127) = 4,911$ ,  $p < 0,05$ ), di mana 15,3% varians dari skor kepatuhan terhadap pengobatan dapat dijelaskan oleh dukungan sosial. Hasil analisis interaksi antara dukungan sosial dan psychological distress ditemukan tidak dapat memengaruhi kepatuhan secara signifikan ( $t(127) = 0,401$ ,  $p > 0,05$ ), sehingga dukungan sosial tidak memoderatori hubungan antara psychological distress dan kepatuhan terhadap pengobatan pada pasien dan penyintas kanker payudara.

.....During breast cancer treatment, patients and survivors are prone to experiencing psychological distress which can affect their adherence in undergoing treatment. This study aims to see the relationship between psychological distress and adherence to treatment with social support as a moderator in breast cancer patients and survivors. This research is a quantitative study involving 129 patients and survivors of breast cancer from various breast cancer communities through purposive sampling techniques. The results of this study indicate that psychological distress is significantly correlated to adherence to treatment ( $t(127) = -4.722$ ,  $p < 0.05$ ), where 14.3% of treatment adherence variance can be explained by psychological distress. Social support was significantly correlated to adherence to treatment ( $t(127) = 4.911$ ,  $p < 0.05$ ), where 15.3% of treatment adherence variance could be explained by social support. Statistical analysis found that the interaction between social support and psychological distress could not significantly affect adherence ( $t(127) = 0.401$ ,  $p > 0.05$ ), so social support did not moderate the relationship between psychological distress and adherence to treatment in patients and survivors of breast cancer.