

Pendidikan dan pelatihan perawat berhubungan signifikan dengan persepsi tentang standardized nursing language (SNL) = Nursing education and training correlated with nurses perception about standardized nursing language (SNL).

Visya Septiana, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20508508&lokasi=lokal>

---

#### Abstrak

Bahasa Keperawatan Terstandarisasi atau Standardized Nursing Language (SNL) merupakan komponen penting pada dokumentasi keperawatan. Penerapan SNL pada dokumentasi keperawatan di Indonesia belum optimal disebabkan oleh perbedaan variasi jenis SNL yang digunakan dan karakteristik perawat yang beragam membuat adanya perbedaan persepsi penerapan SNL pada dokumentasi keperawatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional, bertujuan meneliti korelasi antara karakteristik perawat dengan persepsi tentang SNL. Sampel pada penelitian ini diambil dengan metode consecutive sampling sebanyak 100 perawat dari RSUD X Jakarta Selatan. Instrumen penelitian adalah "Kuesioner Persepsi Perawat tentang SNL" yang dimodifikasi oleh Visya Septiana dengan nilai validitas 0,355 dan nilai reliabilitas Cronbach's Alpha 0,929. Analisis data menggunakan uji korelasi Pearson, uji korelasi Spearman dan Independent T-Test. Hasil uji bivariat menunjukkan hasil jenjang pendidikan dengan p value 0,041, masa kerja (p value 0,044), tahun kelulusan (p value 0,047) dan pengalaman pelatihan SNL NANDA-I, NIC dan NOC (p value 0,035). Peneliti merekomendasikan upaya peningkatan pendidikan dan pelatihan SNL kepada perawat agar dapat menerapkan SNL dalam dokumentasi keperawatan.

<hr>

Standardized Nursing Language (SNL) is an important component in nursing documentation. The application of SNL in nursing documentation in Indonesia has not been optimal, due to the various types of SNL used and the various characteristics of nurses which resulting in different perceptions of SNL implementation. This study uses a cross sectional approach to examine the correlation between nurse characteristics and their perceptions about SNL. The sample in this study was taken by consecutive sampling method as many as 100 nurses from Hospital X in South Jakarta. The research instrument used was "The Nurse's Perception of SNL Questionnaire" modified by Visya Septiana with validity rate 0.355 and Cronbach's Alpha rate 0.929. The analysis of this research using the Pearson correlation test, the Spearman correlation test and the Independent T-Test. Bivariate test results showed a significant relationship between the type of education (p value 0.041), years of service (p value 0.044), year of graduation (p value 0.047) and experience of NANDA-I, NIC and NOC training (p value 0.035) with perceptions of SNL as the dependent variable. Researcher recommend efforts to develop the education or training of SNL to nurses.