

# Analisis malondialdehide pada saliva sebagai biomarker early childhood caries dihubungkan dengan skor dmf-t OHI-S viskositas dan laju alir saliva = Analysis of malondialdehide in saliva as biomarker of early childhood caries associated with dmf-t score OHI-S score salivary viscosity and salivary flow rate

Cahya Marwah Septami Sikumbang, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20515545&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Latar Belakang: Pada tahun 2018 ditemukan angka prevalensi karies anak di Indonesia mencapai 90,2%. Sebelumnya saliva diketahui dapat digunakan sebagai biomarker karies dengan menguji kuantitatif bakteri, identitas konsentrasi protein, karakteristik psikokimia serta karakteristik biokimia. Tujuan: Menganalisis konsentrasi malondialdehide pada saliva anak ECC (early childhood caries) dan bebas karies serta kaitannya dengan skor dmf-t, OHI-S, viskositas saliva dan laju alir saliva. Metode: Mengukur konsentrasi malondialdehide pada 33 sampel saliva anak tersimpan (22 sampel saliva anak ECC dan 11 sampel saliva anak bebas karies) dengan ELISA. Hasil: Analisis Mann Whitney antara konsentrasi malondialdehide pada saliva ECC dan anak bebas karies didapatkan nilai  $p=0$  serta didapatkan nilai  $p=0$  dan  $r= -0,641$  saat dilakukan analisis Spearman. Analisis Kruskal Wallis pada konsentrasi malondialdehide anak dengan skor dmf-t berbeda didapatkan nilai  $p=0,014$  serta didapat nilai  $p=0,004$  dan  $r=0,488$  saat dilakukan analisis Spearman. Tidak terdapat perbedaan bermakna serta korelasi antara konsentrasi malondialdehide terhadap skor OHI-S, viskositas dan laju alir saliva berbeda. Kesimpulan: Konsentrasi malondialdehide pada saliva anak ECC berbeda dengan konsentrasi malondialdehide anak bebas karies, semakin tinggi konsentrasi malondialdehide maka semakin parah karies yang dialami anak. Anak dengan skor dmf- t yang berbeda memiliki konsentrasi malondialdehide yang berbeda pula. Semakin tinggi skor dmf-t semakin tinggi pula konsentrasi malondialdehide. Tidak ditemukan hubungan antara konsentrasi malondialdehide pada anak bebas karies dan ECC terhadap skor OHI- S, viskositas saliva dan laju alir saliva.

.....Background: In 2018, prevalence rate of children's caries in Indonesia reached 90,2%. Previously, saliva was known as a caries biomarker by testing quantitative bacteria, protein concentration identity, psychochemical and biochemical characteristics. Objective: Analyze malondialdehide concentration in children's saliva with ECC (early childhood caries) and caries-free and its relation to dmf-t score, OHI-S, salivary viscosity and salivary flow rate. Methods: Measuring malondialdehide concentration from 33 stored children's saliva samples (22 samples ECC and 11 samples caries-free) using ELISA. Results: Mann Whitney analysis between malondialdehide concentration from ECC children's saliva and caries free children obtained  $p=0$  and then  $p=0$ ,  $r= -0,641$  for Spearman analysis. Kruskal Wallis analysis of malondialdehide concentrations in children with different dmf-t scores obtained  $p=0,014$  and  $p=0,004$ ,  $r=0,488$  for Spearman analysis. There was no significant difference and there was no significant correlation between malondialdehide concentration and OHI-S score, viscosity and different salivary flow rates. Conclusion: Malondialdehide concentration in ECC children's saliva was different from malondialdehide concentration in caries free children, higher malondialdehide concentration show worse caries experienced in children. Children with different dmf-t scores had different malondialdehide concentrations. Higher dmf-t score show higher malondialdehide concentration. There was no relation between malondialdehide

concentration in caries-free children and ECC to OHI-S score, salivary viscosity and salivary flow rate.