

## Hubungan Kesadaran Kondisi Periodontal dengan Pengetahuan Penyakit

**Periodontitis dan Perilaku Kebersihan Mulut Pada Pasien Diabetes Saat Pandemi Covid-19 = The Relationship of Periodontitis Knowledge and Oral Hygiene Behavior to Self-Awareness of Periodontal Condition in Patient with Diabetes During the Covid-19 Pandemic**

Putriani Grisnanda, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20518474&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

**Latar Belakang:** Diabetes mengganggu sistem kekebalan umum yang dapat mempengaruhi respon periodontium terhadap patogen. Tingkat keparahan inflamasi pada pasien periodontitis disertai diabetes melitus (PD-DM) juga dipengaruhi oleh tingkat perilaku kebersihan mulut. Penelitian ini menganalisis hubungan antara kesadaran diri terhadap kondisi periodontal (KP) dengan pengetahuan tentang periodontitis (PP) dan perilaku kebersihan mulut (POH) pada pasien PD-DM. **Metode:** Penelitian ini merupakan penelitian survei potong silang pada masa Pandemi Covid-19. Kuesioner tatap muka dilakukan pada kelompok PD-DM ( $n=29$ ), periodontitis ( $n=31$ ), dan kontrol ( $n=24$ ). Reliabilitas kuesioner ditentukan dengan Cronbach.

dan regresi linier berganda digunakan untuk mengkorelasikan PP dan POH dengan KP pada kelompok PD-DM, periodontitis, dan kontrol. **Hasil:** Uji-T parsial dan uji-F simultan pada kelompok PD-DM masing-masing  $p<0,05$  dan  $p<0,001$ . KP atau OHB pada kelompok PD-DM berkorelasi signifikan dengan KP. Kontribusi PP (56%) lebih besar mempengaruhi KP dibandingkan POH pada kelompok PD-DM.

**Kesimpulan:** Terdapat hubungan antara PP dan POH terhadap KP pada kelompok PD-DM.

.....**Objectives:** Diabetes compromises the general immune system that could affect the response of the periodontium to the pathogen. The severity of inflammation in periodontitis and person with diabetes (PWD) patients was also influenced by the level of oral hygiene behaviour. This study analyzes the relationship between self-awareness of periodontal condition (SAP) to the knowledge of periodontitis (KP) and oral hygiene behaviour (OHB) in diabetic patients. **Materials and Methods:** This study is a cross-sectional survey design during the Covid-19 Pandemic. A face-to-face questionnaire was conducted for periodontitis with the PWD group ( $n=29$ ), periodontitis group ( $n=31$ ), and healthy/gingivitis patients or the control group ( $n=24$ ). The reliability of the questionnaire was determined with Cronbach's . Multiple regression linear used to correlate the KP and OHB to SAP in the PWD group. **Results:** The result of T-test partial and F-statistic test (simultaneous significance test) in PWD group was  $p < 0,05$  and  $p < 0,001$  respectively. The KP or OHB in the PWD group by each or either of their significantly correlate to SAP. The KP contribution (56%) was greater to affect SAP than OHB in the PWD group. **Conclusion:** There was a linear relationship between KP and OHB to SAP in the PWD group.