

Penerapan Program "CEPAT ATASI" dalam pengendalian kadar asam urat pada agregat dewasa dengan gout di Kelurahan Curug Kota Depok = Implementation of the "CEPAT ATASI" Program in controlling uric acid levels in adults aggregate with gout in Curug, Depok City

Dona Sartika, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20520273&lokasi=lokal>

Abstrak

Gout merupakan salah satu penyakit yang belum memadai penatalaksanaannya. Gout dapat menimbulkan komplikasi pada sendi dan organ lainnya seperti ginjal, serta dapat berdampak pada penurunan produktifitas agregat dewasa. Tujuan studi ini adalah untuk memberi gambaran tentang penerapan Inovasi Program CEPAT ATASI terhadap pengendalian kadar asam urat pada agregat dewasa dengan gout di Kelurahan Curug Kota Depok. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan jumlah sampel sebanyak 34 orang dewasa dengan gout yang ada di Kelurahan Curug Kota Depok. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Hasil studi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan agregat dewasa dengan gout sebelum dan sesudah intervensi dengan $p < 0,05$, dan terdapat penurunan kadar asam urat menjadi dalam batas normal sebanyak 58,8%. Rekomendasi program CEPAT ATASI dapat diterapkan oleh perawat untuk pengendalian gout pada agregat dewasa di komunitas.

.....Gout is a disease that has not been adequately managed. Gout can cause complications in joints and other organs such as the kidneys, and can have an impact on decreasing adult aggregate productivity. The purpose of this study is to provide an overview of the effect of the CEPAT ATASI Program Innovation on controlling uric acid levels in adult aggregates with gout in Curug, Depok City. The method used is a case study with a sample of 34 adults with gout in Curug, Depok City. Sampling using purposive sampling technique. The results showed an increase in the aggregate knowledge and skills of adults with gout before and after the intervention with $p < 0.05$, and there was a decrease in uric acid levels to within normal limits of 58.8%. Recommendations for the CEPAT ATASI Program can be applied by nurses for the control of gout in adult aggregate in the community.