

Kontribusi karakteristik perawat dan metode keperawatan primer terhadap kolaborasi perawat primer dengan dokter dan klien di unit penyakit dalam-bedah pelayanan kesehatan Sint Carolus Jakarta tahun 2003

Gabriela Ere Badjo, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=73923&lokasi=lokal>

Abstrak

Peran kolaborasi perawat primer dengan dokter dan klien pada metode keperawatan primer masih belum berjalan dengan baik sehingga dalam pengobatan dan perawatan klien belum optimal. Kondisi ini menyebabkan efektifitas dan efisiensi tindakan keperawatan pada klien juga belum optimal.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kontribusi karakteristik perawat primer dan pengetahuan tentang metode keperawatan primer terhadap kolaborasi perawat primer dengan dokter dan klien di unit rawat inap.

Penelitian ini dilaksanakan di unit penyakit dalam dan bedah P.K. Sint Carolus pada bulan Juli 2003.

Disain penelitian menggunakan deskriptif korelasional dengan metode pendekatan cross seesianul. Populasi adalah semua perawat primer di unit penyakit dalam - bedah di 12 unit rawat inap. Sampel dalam penelitian ini adalah total populasi dimana responden yg memenuhi kriteria penelitian adalah 109 perawat primer. Pengumpulan data menggunakan angket yang terdiri atas isian mengenai karakteristik perawat (umur, tingkat pendidikan, status perkawinan, lama kerja), kuesioner pengetahuan tentang metode keperawatan primer dan kuesioner pelaksanaan kolaborasi perawat primer dengan dokter dan klien didapatkan pada persepsi perawat primer. Uji analisis hubungan atau kontribusi menggunakan uji korelasi dari Spearman.

Hasil penelitian didapatkan hubungan atau kontribusi variabel independen yaitu umur ($r_s = .0,203$, $p = 0,034$), sistem penugasan ($r_s = 0,322$, $p = 0,001$), tindakan keperawatan primer ($r_s = 0,369$, $p = 0,0001$), otonomi dalam pengambilan keputusan ($r_s = 0,477$, $p = 0,0001$) dan total metode keperawatan primer ($r_s = 0,494$, $p = 0,0001$) terhadap variabel kolaborasi perawat primer dengan dokter dan klien. Penelitian ini juga mendapatkan model bahwa otonomi perawat primer dalam pengambilan keputusan ($Beta = 3,329$), dan tindakan keperawatan komprehensif ($Beta = 2,713$) ditambah konstanta (38,091) merupakan prediktor utama terhadap pelaksanaan kolaborasi perawat primer dengan dokter dan klien.

Dari hasil penelitian ini disarankan agar perawat primer diberi penambahan pengetahuan dan pemahaman tentang otonomi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan keperawatan komprehensif.

Daftar Pustaka 69 (1975 - 2443)

"The Contribution of Nurses Characteristics and Primary Nursing Method to the Collaboration of Primary Nurse -- Doctor - Client at the Medical - Surgical unit of St. Carolus Health Service". The role of Primary Nurse with the doctor and the client on the primary nursing method was not implemented well, thus the medical intervention and nursing intervention were also not optimal.

The study was conducted to identify the contribution of the characteristics of primary nurse the knowledge about primary nursing method to the collaboration process of Primary Nurse - Doctor and Client.

Using a descriptive - correlational, especially cross - sectional method, the researcher selected 109 participants from 12 wards of medical-surgical wards of PKSC, Jakarta in July, 2003. The data were gathered by using the distribution of three questionnaires, there are the nurse's characteristic data sheet (age, educational level, marital status, length of work), the knowledge about primary nursing method and the process of collaboration between the nurse - doctor and client which is based on primary nurse perception. The statistical treatment used where Spearman's correlation test and Mann - Whitney test.

The findings indicated that the relationship between the nurse's characteristics : age and the collaboration process was high with the following results; ($r_s=0,203$, $p=0,034$ for age. In term of primary nursing method with collaboration process, the results as follows: tasking system ($r_s 0,322$, $p=0,001$; Nursing Process (1-0 ,369, $p=0,0001$; autonomy in decision making ($r_s=0,477$, $p=0,0001$) and the total of primary nursing method ($r_s,494$. $p=0,00010$. The finding also showed that the nurse's autonomy indecision making (12,713) with constant value of the primary nurse -- doctor - client collaboration.

This findings recommend that the primary nurses need to Improve to loo given some additional knowledge and understanding about autonomy in decision making and comprehensive nursing intervention.

Biliography 69 (1975 - 2003)