

Faktor faktor yang berhubungan dengan kepatuhan bidan terhadap SOP layanan antenatal di Unit KIA Puskesmas Jakarta Pusat tahun 1998

Dien Emawati, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=75364&lokasi=lokal>

Abstrak

Unicef (1996) menyatakan bahwa angka kematian ibu (AKI) di Indonesia tertinggi di negara Asean sebesar 450 per 100.00 kelahiran hidup. Upaya untuk menurunkan AKI adalah dengan melalui layanan antenatal terhadap ibu hamil yang sesuai dengan standard layanan antenatal Depkes RI yaitu 5 T (timbang BB , ukur TB, ukur tekanan darah, ukur TF, vaksinasi TT dan pemberian tablet Fe).

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat gambaran kepatuhan Bidan terhadap SOP layanan antenatal di KIA Puskesmas Jakarta Pusat tahun 1998 dan faktor faktor yang mempengaruhinya. Desain penelitian adalah pendekatan kuantitatif dengan rancangan Cross Sectional. Pengamatan dilakukan di seluruh Puskesmas Jakarta Pusat sebesar 37 dengan 53 tenaga bidan yang berinteraksi dengan ibu hamil sebanyak 159 yang mempunyai kriteria hamil pertama dengan kunjungan pertama. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan daftar isian terhadap pengamatan interaksi antara bidan dengan ibu hamil berikut sarana yang ada di Puskesmas kemudian wawancara terhadap bidan yang dilaksanakan setelah pengamatan. Hasil analisis univariat terhadap 8 komponen kegiatan layanan antenatal , kepatuhan bidan terhadap SOP yang baik dengan nilai skoring 100 menunjukkan sebagai berikut , pelaksanaan cara anamnesis 37.7 % , penimbangan berat badan 37.7 % , pengukuran tinggi badan 30.2 % , pemeriksaan tekanan darah 60.4 % , pemeriksaan tinggi fundus 88.7 % , vaksinasi tetanus toxoid 52.8 % , pemberian tablet besi 49.1 % dan pemberian penyuluhan 22.6 % . Dan dari penjumlahan ke 8 kegiatan tersebut yang merupakan hasil kepatuhan Bidan terhadap SOP layanan antenatal dengan nilai skoring 800, menunjukkan kepatuhan baik sebesar 89 % sedangkan sisanya 9.11 % merupakan kepatuhan tidak baik. Pada struktur menunjukkan hasil sebagai berikut, jumlah Bidan dengan jenis pendidikan Perawat Bidan (PPB - A) lebih banyak daripada jumlah Bidan dengan jenis pendidikan Bidan (PPB - C) , jumlah Bidan yang mempunyai masa kerja > 10 tahun lebih banyak daripada Bidan yang mempunyai masa kerja 5 10 tahun , Bidan yang mempunyai sarana tidak lengkap lebih banyak daripada Bidan yang mempunyai sarana lengkap , dan Bidan yang tidak pernah mendapatkan penghargaan lebih banyak daripada Bidan yang pernah mendapatkan penghargaan.

Hasil analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara masa kerja , pelatihan dan kelengkapan sarana dengan nilai $p < 0.05$ dengan kepatuhan Bidan terhadap SOP layanan antenatal. Nilai rata rata kepatuhan Bidan yang mempunyai masa kerja > 10 tahun (643.0415) lebih tinggi dibanding Bidan yang mempunyai masa kerja 10 tahun (565.7233) , nilai rata rata kepatuhan Bidan yang mempunyai sarana lengkap (662.3225) lebih tinggi dibanding dengan nilai rata rata Bidan yang tidak mempunyai sarana lengkap (598.0596). Dan semakin lama pelatihan semakin tinggi nilai kepatuhan bidan terhadap SOP layanan antenatal ($r = 0.321$).

Dari analisis multivariat menunjukkan adanya hubungan antara kepatuhan Bidan dengan masa kerja (nilai B = 65.954) dan sarana (nilai B = 79.182) dengan keeratan antara kepatuhan Bidan dengan keduanya yang tertinggi adalah sarana ($\beta = 0.385$), kemudian masa kerja ($\beta = 0.321$).

.....In 1996 UNICEF stipulated that maternal mortality rate has the highest among Asean Countries which is 450 per 100.000 of live birth. Efforts to reduce the maternal mortality rate are done through antenatal services toward expected mothers according to standard of antenatal services of the Health Department of the Republic Indonesia such body weight measurement , height measurement , blood tension measurement , fundus height measurement , TT vaccination and administration of Fe tablets.

The purpose of this research is to examine the obedient of midwives in antenatal services SOP in KIA Puskesmas in central Jakarta 1998 and factors which affect them. The research design is a quantitative approach with Cross Sectional Method. The observation were done in 37 Puskesmas with 53 Midwives in interaction with pregnant Women as many as 159 which criteria of first pregnancy during their first visit. Data collection was done by using questioner on the observations of interaction between the midwives and pregnant women, Also the data about facilities available in the Puskesmas and followed by interview data towards the midwives that conducted the observation.

The proceeds of univariate analysis of 8 activity of the midwives components with the best score 100 points, shows as follows : anamnesis method implementation 37,7 % , weight measurements 37,7 % , blood pressure measurements 60,4 % , fundus height measurements 88,7 % , toxoid tetanus vaccination 52,8 % , feerum tablets administration 49,1 % , and consoling 22,6 % . Total score of the 8 activity is the obedient of midwives with 800 score which indicates good obedient 1,89 % , while the rest 98,11 % is not good obedient. The results show as follows : the number of midwives that have midwives nurse education is larger than the number of midwives education , the number of midwives that have worked > 10 years is larger than the those that have worked < 10 years , midwives that do not have complete facilities is larger than those that have complete facilities , and midwives never obtained certificates is larger than those that have obtained certificates.

Bivariate analysis indicates that there is significant correlation between years of work, training and facilities with $p < 0,05$ and the obedient of midwives. Average value of obedient of midwives that have worked > 10 years (643.0415) is higher compared to that have work 5 10 years (565.7233) , average value of obedient of midwives that have complete facilities (662.3225),is higher compared to average value of obedient of midwives that do not have complete facilities (598.0596). The longer the midwives receive training the higher their obedient score ($r = 0.321$).

From the multivariate analysis it can be seen that there is a correlation between the obedient of midwives and the length of work ($B=65.954$) and facilities ($B=79,1182$) and closeness between the obedient of midwives with both factors : the highest one is with facilities ($\beta = 0.385$), and then with length of work ($\beta = 0.321$).