

Analisis kejadian kematian perinatal di RSUD kabupaten Serang pada tahun 1997

Encep Mukardi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=77861&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Angka kematian perinatal di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu 45 per 1000 kelahiran (tahun 1994) bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Penyebab utama kematian perinatal adalah asfiksia, komplikasi BBLR (Bayi Berat Lahir Rendah), infeksi dan trauma kelahiran. RSUD Serang sebagai Rumah Sakit Kelas B di Wilayah Keresidenan Banten mempunyai kematian perinatal cukup tinggi yaitu 226 dari 1531 kelahiran (tahun 1997), sehingga perlu diperoleh informasi faktor-faktor yang berhubungan dengan kematian perinatal itu. Faktor-faktor tersebut adalah faktor ibu (umur, paritas, komplikasi kehamilan dan persalinan, jarak kelahiran dan kondisi kesehatan ibu), faktor janin (berat bayi, asfiksia, infeksi dan trauma lahir) dan juga diketahui faktor manajemen rumah sakit dan manajemen medik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran dari faktor-faktor yang berhubungan dengan kematian perinatal. Disain penelitian adalah survey, retrospektif selama satu tahun dari Januari sampai Desember 1997 dengan mengambil penelitian seluruh kematian perinatal sejumlah 226. Untuk mengetahui hubungan antara kematian perinatal dilakukan analisis "chi square". Untuk mendapatkan data kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam.

Hasil penelitian menunjukkan dari 9 variabel, 5 menunjukkan arah perbedaan yang bermakna dalam proporsi kematian perinatal menurut :

1. Umur ibu, ($p < 0,05$)
2. Paritas ibu, ($p < 0,05$)
3. Komplikasi kehamilan, ($p < 0,05$)
4. Kondisi kesehatan ibu, ($p < 0,05$)
5. Berat bayi, ($p < 0,05$).

Dari wawancara mendalam diperoleh bahwa sarana dan prasarana dibagian perinatologi sangat terbatas. Lahir mati menunjukkan proporsi yang paling besar yaitu 63,3 % dari seluruh kematian perinatal, lahir mati ini terjadi sebelum masuk rumah sakit, penulis menyarankan agar Puskesmas didalam pelayanan medik khususnya untuk kesehatan ibu hamil dan bayi terus dibina oleh RSUD Serang bersama Dinas Kesehatan Serang dalam kegiatan Rumah Sakit Sayang bayi dan Rumah Sakit Sayang Ibu. Penyebab kematian Neonatal dini di RSUD Serang Proporsinya yang terbesar adalah BBLR (berat bayi Lahir rendah) sebesar 66,23 % , hal ini merupakan tuntutan dan disarankan agar RSUD Serang khususnya bagian perimatologi meningkatkan kemampuan untuk dapat merawat BBLR dengan sarana, prasarana dan kemampuan tenaga yang memadai. Untuk Dinas Kesehatan dan Instansi lintas Sektor disarankan untuk meningkatkan peranannya dalam cakupan pemeriksaan antenatal di Puskesmas Daftar Kepustakaan : 26 (1984 - 1998)

<i>ABSTRACT</i>

Analysis of Perinatal : Death in General Public Hospital of Serang 1997 Perinatal death rate in Indonesia is still high (i.e 45 per 1000 of birth a year 1994) if it's compared to other ASEAN countries. It is making caused by asphyxia, complication of low birth weight, infection and trauma during delivery.

General Public Hospital Serang is a class B Hospital in Banten area, where perinatal death is 226 out of 1531 births (year 1997). Information is needed to learn about factors that are factors related to perinatal death.

They are maternal factors (age, parities, complication of pregnancy and childbirth, childbriths, distance and health condition), Fetal factors (baby's weight, aspphyxia, infection and trauma during delivery) and also hospital management and medical management factors.

The purpose of this research is to get descriptive information of factors related to perinatal death . The methode of research is survey, based on one year deliveries from January to December 1997, of which have a total of 226 perinatal death. To learn the ralationship between variables " Chi Square " analysis was aplied to collect qualitatif information in depth interview was caned out.

The result of research shows that 5 out of 9 variables have relationship with perinatal death namely :

1. Mother's age (pc0,05)
2. Mother's parities (p<0,05)
3. Complication of pregnancy (p<0,05)
4. Health condition of mother and weight of each baby (p<0,05)

From the interview , it is know that perinatology departement has only got limited facilities . Still birth shows a great proportion (63,3 % from all perinatal death). This still birth ins happened before mother was hospitalized . The writer suggest that health centers should be developed constantly, with regard to it, medical service especially that of health service for pregnant woman and baby, by General Public Hospital and Health office Serang related to program that of Hospital loves mother and baby friendly . The cause o great proportion premature Neonatal death in General Public Hospital Serang is low birth weight, i.e 66,23 % . It's suggested to General Public Hospital Serang, especially its perinatology department to increase its capability in providing service for low birth weight babies by using improved facilities. It is sugested to Health office, to improve it's function in antenatal service in every Health Center.

Bibliography 26 (1984 - 1998).</i>