

Faktor prognostik penderita pascainfark miokard akut

Rus Munandar, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=82225&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Untuk menentukan variabel prediktor terhadap ketahanan hidup penderita pascainfark dilakukan penelitian secara retrospektif terhadap 174 orang penderita yang dirawat di RSJHK dalam periode 1 Januari 1986 sampai dengan 31 Desember 1987. Pengamatan penderita dilakukan sampai tanggal 28 Februari 1989.

Sebanyak 16 variabel diuji secara univariat dengan uji Log-Rank dan selanjutnya dengan 'Step-wise variable selection' untuk analisis multivariat. Terbukti secara bermakna 5 variabel yang mempengaruhi angka ketahanan hidup yaitu: jenis kelamin ($X^2 = 15,70$; $p < 0,00$), riwayat infark terdahulu ($X^2 = 6,55$; $p < 0,025$), riwayat penyakit diabetes mellitus ($X^2 = 7,82$; $p < 0,01$), riwayat gagal jantung selama perawatan ($X^2 = 14,58$; $p < 0,005$) dan adanya blok cabang berkas kanan His ($X^2 = 15,29$; $p < 0,005$). Dan 4 diantaranya, kecuali riwayat penyakit DM merupakan faktor rediktor yang independen

Angka ketahanan hidup secara keseluruhan yang diperoleh dengan cara Kaplan Meir adalah sebesar $89,6 \pm 2,36$ % selama pengamatan 3 tahun. Diperlukan tindakan yang agresif terhadap penderita dengan faktor-faktor tersebut untuk memperbaiki ketahanan hidup penderita pascainfark berikut kualitas hidupnya.