

## The influence of katu (*Sauropus androgynus* (L.) Merr.) and papaya (*Carica papaya* L.) leaves consumption on volume, vitamin A level and protein content of breast milk

Farida I. Tjahjadi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=83291&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Pada beberapa daerah di Indonesia, secara tradisional dianjurkan pada ibu menyusui untuk mengkonsumsi daun Katu (*Sauropus androgynus* (L.) Merr.) dan daun Papaya (*Carica papaya* L.) dalam usaha meningkatkan produksi air susu ibu. Namun hal tersebut belum terbukti secara ilmiah pada manusia.

<br><br>

Sehubungan dengan itu, telah dilakukan penelitian pengaruh konsumsi daun Katu dan daun Papaya terhadap volume, konsentrasi vitamin A dan protein air susu ibu selama 7 hari berturut-turut. 45 orang ibu menyusui dari kabupaten Bogor (rural), yang 1-3 bulan setelah melahirkan dibagi dalam 3 kelompok secara acak dengan stratifikasi (stratified randomly assigned), yaitu kelompok Katu, Papaya dan Kontrol. Setiap kelompok terdiri dari 15 orang ibu menyusui. Kelompok Katu dan Papaya masing-masing mengkonsumsi 400 gram daun Katu dan 300 gram daun Papaya berupa sayur selain makanan mereka sehari-hari, sedangkan kelompok Kontrol tidak mendapat tambahan tersebut. Untuk seleksi subjek dilakukan pengukuran antropometrik dan pemeriksaan fisik terhadap ibu dan bayinya, serta pemeriksaan Hb ibu ( $Hb > 10\text{gr}\%$ ). Berdasarkan penelitian pendahuluan, respons tertinggi yang diamati selama 7 hari penelitian adalah pada hari terakhir penelitian (ke - 7).

<br><br>

Intake ibu sebelum dan pada hari terakhir penelitian dicatat dan dihitung selama 24 jam (dietary recall) untuk 2 hari berturut-turut. Volume, konsentrasi vitamin A dan protein air susu ibu diteliti sehari sebelum dan pada hari terakhir penelitian.

<br><br>

Pada hari terakhir penelitian, volume air susu ibu meningkat secara bermakna pada kelompok Katu ( $P=0.000$ ) dan kelompok Papaya ( $P=0,002$ ) dibandingkan dengan kelompok Kontrol. Peningkatan tertinggi adalah pada kelompok Katu, tetapi tidak berbeda bermakna dengan kelompok Papaya ( $P=0.129$ ).

Peningkatan volume ini mempunyai korelasi secara bermakna dengan intervensi yang dilakukan, dan rupanya hal ini disebabkan oleh peningkatan intake vitamin A ibu ( $P=0.0001$ ). Tetapi tidak mempunyai korelasi baik dengan peningkatan intake energi maupun dengan peningkatan intake protein ( $P=0,5796$  dan  $P=0,8539$ ).

<br><br>

Konsentrasi vitamin A air susu ibu juga meningkat secara bermakna pada kedua kelompok treatment dibandingkan dengan kelompok Kontrol ( $P=0.028$  untuk kel. Katu dan  $P=0,003$  untuk kel. Papaya).

Peningkatan tertinggi diamati pada kelompok Papaya tetapi tidak berbeda bermakna dibandingkan dengan kelompok Katu ( $P=0,241$ ). Total vitamin A air susu ibu dalam 24 jam juga meningkat karena peningkatan volume pada kedua kelompok treatment dibandingkan dengan kelompok Kontrol ( $P=0,002$  untuk kelompok Katu dan  $P=0,001$  untuk kelompok Papaya).

<br><br>

Tidak tampak adanya perbedaan secara bermakna pada konsentrasi protein air susu ibu pada hari terakhir penelitian pada ketiga kelompok ( $P=0.7607$ ). Namun total protein air susu ibu dalam 24 jam meningkat secara bermakna karena peningkatan volume pada kelompok Katu. Ternyata pula bahwa tidak ada korelasi bermakna antara peningkatan konsentrasi protein air susu ibu dengan peningkatan intake protein ibu ( $P=0,3433$ ).

<br><br>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi daun Katu dan daun Papaya oleh ibu menyusui dapat meningkatkan produksi dan konsentrasi vitamin A air susu ibu secara bermakna, tetapi tidak meningkatkan konsentrasi proteinnya. Walaupun demikian total protein air susu ibu dalam 24 jam meningkat secara bermakna pada kelompok Katu karena peningkatan volume air susu ibu.