

Kejadian stress pasca traumatis pada ibu post partum dengan seksio sesaria emergensi, vakum dan spontan di rumah sakit Abdoel Moeloek & rumah sakit Urip Sumoharjo Bandar Lampung

Anita, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=94105&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian studi komparatif dengan pendekatan cross sectional. Bertujuan untuk mengetahui perbedaan kejadian stres pasca traumatis pada ibu post partum dengan seksio sesaria emergensi, vakum, dan partus spontan. Populasi penelitian ini adalah ibu post partum dengan Seksio sesaria emergensi dengan indikasi partus macet, dan ibu primipara bersalin dengan vakum dan spontan yang dirawat di Rumah Sakit Abdoel Moeloek & Rumah Sakit Urip Surnoharjo Bandar Lampung. Jumlah sampel 81 responden yang terdiri dari 3 kelompok responden dengan seksio sesaria emergensi, vakum dan partus spontan masing-masing responden berjumlah 27 orang. Kejadian stres pasca traumatis pada ibu post partum dengan seksio sesaria berdasarkan hasil observasi dan Kuesioner menunjukkan hasil yang sama yaitu kejadian stres berat 11.1% dan stres ringan 88.9%. Kejadian stres pasca traumatis pada ibu post partum dengan vakum berdasarkan hasil observasi dengan stres berat 40.7% dan dengan kuesioner kejadian stres berat 37%. Kejadian stres pasca traumatis pada ibu post partum dengan partus spontan menunjukkan angka kejadian yang sama yaitu stres berat 3.7% dan stres ringan 96.3%.

Hasil penelitian dengan uji chi square menyimpulkan bahwa ada perbedaan bermakna antara kejadian sires pasca traumatis pada ibu Seksio sesaria emergensi, vakum, dan partus spontan. Mengingat tingginya kejadian stres pasca traumatis pada pertolongan persalinan dengan alat vakum ataupun operasi rnaka penelitian ini merekomendasikan pentingnya ante natal care (param education agar ibu dapat bersalin secara normal dan mendapatkan ibu yang sehat, bayi sehat dan keluarga sehat).

<hr><i>This study was a comparative study design with cross sectional approach. The aim of the study is to find the difference between post traumatic stress disorder in post partum mother with emergency section caesarean, vacuum, and spontaneous delivery. Population of this research is post partum mother with emergency section caesarean with indication of snick delivery indication, and primipara mother give birth by vacuum and spontaneous that hospitalised at Abdoel Moeloek hospital and Urip Sumoharjo hospital, Bandar Lampung. There were S1 sample of respondent that consist of 3 groups of respondents with emergency section caesarean, vacuum and spontaneous delivery, with 27 respondent In each group post traumatic stress disorder in post partum mother with section caesarean based on observation and questioner result shows same result as severe stress 11,1% and light stress 88,9%. Post traumatic stress in post partum mother with vacuum based on observation result with severe stress is 40,7% and by questioner severe stress is 37%. Post traumatic stress case in post partum mother with spontaneous delivery shows the same rate, which is severe stress 3,7% and light stress 96,3%.

Research study analized by chi square test, it shows a significant difference between post traumatic stress disorder in post partum mother with emergency section caesarean, vacuum and spontaneous delivery. Evidence that there is increasing incident rate of pasca traumatic stress disorder at delivery service with

vacuum or section caesarean, this research recommend to all health that ante natal care / parent education are important to make woman delivery safety or normal and to support the women, baby and family health.</i>