

Faktor-faktor yang berhubungan dengan kadar Hb tinggi di kalangan petugas pemadam kebakaran Jakarta = The factors that correlated with high Hb level of firefighters

Engkun Maskun, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=98546&lokasi=lokal>

Abstrak

Latar belakang dan tujuan

Bahan berbahaya dalam kebakaran dapat mempengaruhi kesehatan petugas pemadam. Bahan kimia yang terkandung dalam asap kebakaran akan terserap kedalam tubuh dan mempengaruhi fungsi organ-organ tubuh, di antaranya adalah peningkatan kadar hemoglobin darah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pajanan asap kebakaran terhadap peningkatan kadar hemoglobin darah pada tim pemadam kebakaran.

Metode

Penelitian ini menggunakan disain studi kasus-kontrol terhadap 120 subjek terdiri dari 40 kasus kadar Hb tinggi dan 80 kontrol dengan memadankan umur. Subjek penelitian adalah anggota pasukan, sopir mobil pemadam, kepala regu dan kepala peleton pemadam kebakaran. Tingkat pajanan dihitung secara skoring terhadap faktor-faktor yang terkait pajanan.

Hasil dan kesimpulan

Faktor-faktor pajanan yang diteliti yaitu umur, masa dinar, jabatan, lama pemadaman, frekuensi pemadaman, pemakaian masker dan kebiasaan merokok, sebagaimana statistik tidak ada hubungan yang bermakna dengan kadar Hb ($p > 0,05$). Hipotesis tingkat pajanan asap yang tinggi mempunyai risiko kadar Hb tinggi lebih besar dibanding tingkat pajanan rendah, ditolak. Tingkat pajanan tidak berhubungan bermakna secara statistik dengan kadar Hb ($p > 0,05$).

<hr><i>Background and objective

The exposure of fire smokes contained hazardous substances ;potentially effect firefighter's health. The cumulative effect of these substances can abnormally increase the haemoglobin level. This study is aimed at finding the associations of fire smokes exposure to high haemoglobin level and its risk factors.

Methods. This study design was a case-control study involving sample of 120 subjects consisted of 40 cases of high Hb level and 80 controls. The exposure levels offire smokes were scored for exposure related factors.

Results and conclusions. The exposure factors included age , periode of job, job position, length of service, frekuency of service, masker usage, and smoking habit were no statistical significant association to high Hb level ($p>0,05$). The hypothesis stated the high exposure level offire smokes have higher risks :3f Hb level than low exposure level alit was rejected . The level of exposure was no statistically significant association with Hb level ($p>0,05$).</i>