

Penerapan Teori Virginia Henderson Pada Pasien Akut Mieloblastik Leukemia Dengan Cemas dan Takut Kekambuhan Melalui Intervensi Hipnosis Lima Jari = Application of Virginia Henderson's Theory in Patients with Acute Myeloblastic Leukemia with Anxiety and Fear of Relapse Through Five Finger Hypnosis Intervention

Rudi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920522746&lokasi=lokal>

Abstrak

Pasien Akut Mieloblastik Leukemia (AML) berisiko mengalami kekambuhan, sehingga masalah cemas dan takut kekambuhan dapat memengaruhi kualitas hidup pasien AML. Pasien memerlukan bantuan untuk mengatasi masalah tersebut agar dapat mengatasi sendiri ketika masalah tersebut muncul. Penerapan konsep The Activities of Leaving Virginia Henderson merupakan format pengkajian yang sesuai dengan kondisi lima kasus yang dikelola Residen. Residen mengaplikasikan Evidence Based Practice Nursing (EBPN) dalam perawatan pasien cemas dan takut kekambuhan. EBPN yang digunakan bertujuan untuk mengatasi masalah cemas dan takut kekambuhan pada pasien AML. EBPN yang digunakan sebagai intervensi keperawatan adalah hipnosis lima jari. Intervensi hipnosis lima jari dalam pengelolaan lima kasus kelolaan berpengaruh signifikan dalam menurunkan nilai cemas dan takut kekambuhan. Intervensi hipnosis lima jari untuk membantu pasien mengatasi masalah cemas dan takut kekambuhan pada pasien AML. Perawat onkologi yang merawat pasien AML yang mengalami masalah psikologis yang mengakibatkan cemas dan takut kekambuhan dapat menggunakan teori pendekatan The Activities of Leaving Virginia Henderson. Perawat onkologi juga dapat menggunakan intervensi hipnosis lima jari untuk menurunkan tingkat cemas dan takut kekambuhan pada pasien AML.

.....Patients with Acute Myeloblastic Leukemia (AML) are at risk of recurrence, so anxiety and fear of recurrence can affect the quality of life of AML patients. Patients need help dealing with these problems so they can deal with them on their own when they arise. The application of the concept of The Activities of Leaving Virginia Henderson is an assessment format that is appropriate to the conditions of the five cases managed by the Resident. Residents apply Evidence-Based Practice Nursing (EBPN) in the care of patients who are anxious and afraid of recurrence. The EBPN used aims to overcome anxiety and fear of recurrence in AML patients. The EBPN used as a nursing intervention is five-finger hypnosis. The five-finger hypnosis intervention in the management of five managed cases had a significant effect on reducing anxiety and fear of recurrence. Five-finger hypnosis intervention to help patients overcome anxiety and fear of recurrence in AML patients Oncology nurses who treat AML patients who experience psychological problems that cause anxiety and fear of recurrence can use The Activities of Leaving Virginia Henderson Approach Theory. Oncology nurses can also use five-finger hypnosis interventions to reduce anxiety and fear of recurrence in AML patients.