

Rekapitulasi Waktu Penggunaan Obat Pada 30 Obat dengan Penggunaan Terbanyak Pada Depo Rawat Jalan = Recapitulation of Drug Use Time for 30 Drugs with the Most Use at Outpatient Depots

Arief Fitriansyah, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920526964&lokasi=lokal>

Abstrak

Penggunaan obat yang bersamaan dengan makanan dapat menyebabkan adanya interaksi obat dengan makanan. Interaksi obat dengan makanan terjadi apabila makanan yang dikonsumsi dapat mengubah efek dari suatu obat tersebut saat diberikan bersamaan atau hampir bersamaan. Makanan dapat mengubah efek dari suatu obat dengan cara memperkuat atau memperlemah, memperpanjang atau memperpendek kerja obat melalui pengaruh yang disebabkan makanan pada proses absorpsi, distribusi, metabolisme atau ekskresi obat di dalam tubuh. Pasien di RSAB Harapan Kita mayoritas adalah pasien anak-anak, dimana anak-anak memiliki fisiologi tubuh yang rentan apabila terjadi kasus interaksi yang berat antara obat dengan makanan. Concurrent use of drugs with food can cause drug interactions with food. Drug interactions with food occur when the food consumed can change the effect of a drug when given together or almost simultaneously. Food can change the effect of a drug by strengthening or weakening, prolonging or shortening the action of the drug through the influence caused by food on the process of absorption, distribution, metabolism or excretion of drugs in the body. The majority of patients at Harapan Kita Hospital are children, where children have a physiology that is vulnerable in cases of severe interactions between drugs and food.