

**Perbandingan derajat nyeri pascabedah laparotomi digestif atas umbilikus dengan ginekologi yang mendapat kombinasi analgetik intravena dan epidural = Comparison of postoperative pain level between upper abdominal digestive laparotomy and gynecological surgeries receiving a combination of intravenous and epidural analgesics**

Aqila Naridipta Anindyahapsari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920539429&lokasi=lokal>

---

#### Abstrak

Latar Belakang. Nyeri pascabedah adalah masalah utama pascalaparotomi yang dapat meningkatkan mortalitas dan morbiditas pascabedah. Derajat nyeri pascalaparotomi dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya jenis pendekatan laparotomi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menilai perbandingan derajat nyeri pascalaparotomi digestif di atas umbilikus dan ginekologi yang mendapat analgesia kombinasi intravena dan epidural. Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode kohort retrospektif terhadap 34 pasien wanita yang menjalani laparotomi digestif atas dan 34 pasien laparotomi ginekologi yang berusia 18 hingga 65 tahun dengan klasifikasi ASA I hingga III di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo dari Januari 2022 hingga Juli 2023. Data pasien dipilih secara konsekuatif dari rekam medik rumah sakit. Pasien dengan data yang tidak lengkap dan komplikasi pascabedah yang serius dikecualikan dari penelitian. Data kemudian diolah menggunakan SPSS dan dianalisis dengan uji Mann-Whitney. Hasil. Rata-rata derajat nyeri pasca bedah sewaktu beristirahat pada pasien yang menjalani laparotomi digestif di atas umbilikus yaitu sebesar  $2.09 \pm 0.9$  dan  $2.53 \pm 1.187$  pada laparotomi ginekologi. Sedangkan derajat nyeri sewaktu bergerak pada pasien yang menjalani laparotomi digestif di atas umbilikus sebesar  $3.82 \pm 1.242$  dan  $3.12 \pm 0.046$  pada pasien yang menjalani laparotomi ginekologi. Terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik pada perbandingan derajat nyeri pascabedah laparotomi sewaktu bergerak ( $p = 0.016$ ). Derajat nyeri sewaktu istirahat laparotomi digestif di atas umbilikus dengan pasien laparotomi ginekologi tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna. ( $p = 0.098$ ). Kesimpulan. Dengan pemberian kombinasi analgesia epidural dengan analgetik intravena, derajat nyeri pascabedah sewaktu bergerak pada laparotomi digestif di atas umbilikus lebih tinggi signifikan dibandingkan laparotomi ginekologi meskipun secara klinis tidak bermakna. Tidak terdapat perbedaan signifikan derajat nyeri pada waktu istirahat pada kedua jenis pembedahan.

.....Introduction. Postoperative pain can lead to serious complications. The intensity of postoperative pain is influenced by numerous factors, such as type of laparotomy. Multimodal analgesia is recommended to manage postlaparotomy pain. This study aims to compare the intensity of post digestive and gynecology laparotomy pain in patients with intravenous and epidural analgesia. Method. This study is conducted using retrospective cohort method approach on 34 female patients underwent upper digestive laparotomy and 34 female patients underwent gynecology laparotomy, aged 18 to 65, classified as ASA I -- III in Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital from January 2022 to July 2023. Patient data was consecutively selected from hospital's medical records. Patient with incomplete data and severe postoperative complications were excluded from the study. The data was then analyzed using SPSS and the analysis were tested using the Mann-Whitney. Results. The mean of postoperative pain at rest in patients undergoing upper umbilical

digestive laparatomy is  $2.09 \pm 0.9$ , and  $2.53 \pm 1.187$  in gynecologic laparotomy. Meanwhile, the mean of postoperative pain during movement in patients undergoing upper umbilical digestive laparatomy is  $3.82 \pm 1.242$  and  $3.12 \pm 0.946$  for gynecologic laparatomy. There is statistically significant difference in the comparison of postoperative pain levels during movement with a p value of 0.016. There is no significant difference in postoperative pain levels at rest between patients undergoing digestive laparotomy upper umbilicus and gynecologic laparotomy patients with p value of 0.098. Conclusion. The degree of postoperative pain during movement is statistically significant but not clinically important in digestive laparatomy upper umbilicus compared to gynecologic laparotomy when given the combination of intravenous and epidural analgetics.