

Hubungan Jenis Sediaan Obat Antiretroviral terhadap Kepatuhan Minum Obat pada Anak Terinfeksi HIV di Poliklinik Alergi dan Imunologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta

Rizta Aulia Widyana, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920547997&lokasi=lokal>

Abstrak

Infeksi HIV dapat dikontrol oleh obat antiretroviral yang diminum seumur hidup untuk menekan jumlah virus dengan keadaan bahwa keberhasilan terapi dapat menentukan prognosis pasien. Salah satu aspek yang memengaruhi keberhasilan terapi adalah kepatuhan minum obat. Pada anak, kepatuhan dapat dipengaruhi oleh sediaan karena berpotensi menimbulkan keluhan seperti sulit menelan atau rasa. Penelitian ini menganalisis hubungan antara jenis sediaan obat dengan kepatuhan minum obat pada anak terinfeksi HIV di Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSCM Jakarta. Data dikumpulkan dari 94 pengasuh dari 101 anak terinfeksi HIV menggunakan kuesioner dari Center for Pharmaceutical Management yang telah digunakan di Afrika Selatan. Sebanyak 85 anak yang mengonsumsi tablet atau kapsul memiliki tingkat kepatuhan rendah 60% dan tinggi 40%. Sebanyak 16 anak yang mengonsumsi puyer atau sediaan campuran memiliki kepatuhan rendah 62,5% dan tinggi 37,5%. Analisis chi-square dengan komponen 2x2 yaitu sediaan tablet/kapsul dan puyer/campuran serta kepatuhan rendah dan tinggi menghasilkan $p=0.851$ sehingga tidak ditemukan hubungan bermakna. Hasil ini berbeda dengan penelitian serupa di Afrika yang menunjukkan hubungan bermakna. Sebagai kesimpulan, pada penelitian ini tidak ditemukan hubungan antara bentuk sediaan obat antiretroviral dengan kepatuhan minum obat.