

Hubungan Dukungan Keluarga dengan Kejadian Depresi pada Remaja di Rawat Jalan Rumah Sakit Jiwa di Kota Bogor = The Relationship between Family Support and the Incidence of Depression in Adolescents in Outpatient Psychiatric Hospitals

Nena Noviana, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920566596&lokasi=lokal>

Abstrak

Remaja saat ini mengalami krisis kesehatan mental seperti depresi karena kurang kuatnya dukungan keluarga. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan kejadian depresi pada remaja. Metode yang digunakan cross sectional dengan teknik purposive sampling. Jumlah responden penelitian sebanyak 101 remaja dengan depresi di rawat jalan rumah sakit jiwa. Kuesioner yang digunakan merupakan kuesioner dukungan keluarga yang berjumlah 19 pertanyaan dan kuesioner Beck Depression Inventory-II (BDI-II) merupakan salah satu alat ukur yang populer dan paling banyak digunakan dalam mendeteksi depresi berjumlah 21 pertanyaan. Uji statistik menggunakan Chi Square dengan signifikansi ($\hat{I} \pm 0,050$) menunjukkan adanya hubungan yang bermakna dukungan keluarga dengan kejadian depresi pada remaja di poliklinik rumah sakit jiwa ($p=0,001$). Disarankan agar perawat di tatanan komunitas dan institusi pendidikan bekerja sama untuk memberikan edukasi kesehatan terkait kesehatan mental remaja kepada remaja khususnya di rawat jalan rumah sakit jiwa.

.....Adolescents are currently experiencing a mental health crisis such as depression due to lack of strong family support. This study aims to determine the relationship between family support and the incidence of depression in adolescents. The method used was cross sectional with purposive sampling technique. The number of research respondents was 101 adolescents with depression in outpatient psychiatric hospitals. The questionnaire used was a family support questionnaire totaling 19 questions and the Beck Depression Inventory-II (BDI-II) questionnaire is one of the popular and most widely used measuring instruments in detecting depression totaling 21 questions. Statistical tests using Chi Square with significance ($\hat{I} \pm 0.050$) showed a significant relationship between family support and the incidence of depression in adolescents in outpatient psychiatric hospitals $pvalue < 0.001$. It is recommended that nurses in health services and educational institutions work together to provide health education related to adolescent mental health to adolescents, especially in outpatient psychiatric hospitals.