

Hubungan Dukungan Keluarga dan Rehospitalisasi Klien Gagal Jantung Kongestif = The Correlation between Family Support and Rehospitalization of Congestive Heart Failure Clients

Tri Neni Agustina, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920566598&lokasi=lokal>

Abstrak

Pendahuluan : Penyakit gagal jantung kongestif memiliki kejadian rehospitalisasi yang terbilang cukup tinggi. Dukungan keluarga menjadi salah satu bentuk tindakan untuk menurunkan masalah psikologis pada klien gagal jantung kongestif selama perawatan di rumah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan dukungan keluarga dan rehospitalisasi pada klien gagal jantung kongestif. Metode : Desain penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik purposive sampling pada 107 responden. Kriteria inklusinya yaitu klien gagal jantung kongestif yang berobat ke poliklinik dengan kelas NYHA 1-4 tanpa keluhan sesak napas atau kelelahan. Hasil : Dukungan keluarga tidak mempengaruhi rehospitalisasi klien gagal jantung kongestif. Analisis: Penelitian ini menunjukkan tidak terdapat hubungan dukungan keluarga dengan rehospitalisasi klien gagal jantung kongestif dengan p value = 0,059 (p value > 0,05). Rekomendasi : Asuhan keperawatan pada klien dan keluarga dilakukan secara komprehensif untuk menurunkan angka rehospitalisasi klien gagal jantung kongestif.

.....Introduction: Congestive heart failure disease has a fairly high incidence of rehospitalization. Family support is one form of action to reduce psychological problems in congestive heart failure clients during home care. This study aims to identify the relationship between family support and rehospitalization in congestive heart failure clients. Methods: This research design is descriptive quantitative with purposive sampling technique on 107 respondents. The inclusion criteria are congestive heart failure clients who seek treatment at the polyclinic with NYHA classes 1-4 without complaints of shortness of breath or fatigue. Results: Family support does not affect the rehospitalization of congestive heart failure clients. Analysis: This study shows there is no relationship between family support and rehospitalization of congestive heart failure clients with p value = 0.059 (p value > 0.05). Recommendation: Nursing care for clients and families is carried out comprehensively to reduce the rehospitalization rate of congestive heart failure clients.