

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

- Pada anak-anak usia 7 tahun berdasarkan variabel-variabel lingkungan perawatan dental menurut CFSS-DS, tingkat kecemasan paling tinggi ditemukan pada jarum suntik., tingkat kecemasan tinggi terdapat pada saat membuka mulut, tingkat kecemasan sedang ditemukan pada saat dilihat oleh orang lain, tingkat kecemasan rendah ditemukan pada saat tersedak, dan tingkat kecemasan terendah ditemukan pada saat seseorang memasukan instrument ke dalam mulutmu.
- Pada anak-anak usia 10 tahun berdasarkan variabel-variabel lingkungan perawatan dental menurut CFSS-DS, tingkat kecemasan paling tinggi ditemukan pada jarum suntik., tingkat kecemasan tinggi terdapat pada saat dokter gigi mengebor, kecemasan sedang ditemukan pada saat dilihat oleh orang lain, tingkat kecemasan rendah ditemukan pada saat tersedak, dan tingkat kecemasan terendah ditemukan pada saat seseorang memasukan instrument ke dalam mulutmu.
- Anak dengan tingkat kecemasan dental tinggi lebih banyak terdapat di usia 10 tahun (17%) daripada anak usia 7 tahun (14%).
- Rata-rata Anak perempuan (35,4%) pada usia 7 dan 10 tahun lebih banyak yang memiliki tingkat kecemasan dental tinggi dibandingkan anak laki-laki (26,3%).

7.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah:

- Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode yang lebih sederhana atau menyempurnakan metode yang telah digunakan. Misalnya dengan memberikan pertanyaan silang kepada orang tua atau dokter gigi yang merawat anak tersebut.

- Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan subyek dengan jumlah yang lebih banyak dan jumlah antara subyek laki-laki dengan perempuan seimbang untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

