

ABSTRAK

Nama

: Kartika

Program Studi

: S1-4 Reguler Peminatan Epidemiologi

Judul

:

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN DEFAULT PENDERITA TUBERKULOSIS PARU DI RSUD BUDHI ASIH JAKARTA TAHUN 2008

Default adalah salah satu masalah penting dalam pengendalian TB paru. Default menyebabkan penderita berpotensi untuk mengalami resistensi terhadap OAT sehingga sulit disembuhkan. Penelitian ini menilai proporsi default TB paru dan faktor yang berhubungan di RSUD Budhi Asih Jakarta tahun 2008, dan desain studi penelitian adalah *Cross Sectional*. Jumlah sampel yang dianalisis adalah 188 dari 407 penderita.

Penelitian ini menemukan proporsi kasus default TB paru di RSUD Budhi Asih Jakarta tahun 2008 sebesar 8,0% (15 kasus). Faktor-faktor yang berhubungan bermakna secara statistik dengan default penderita TB paru di RSUD Budhi Asih Jakarta tahun 2008 adalah umur (nilai $p=0,002$) dan efek samping obat (nilai $p=0,05$) sedangkan jenis kelamin, status pekerjaan, tipe penderita, riwayat pengobatan, jenis ESO, keberadaan PMO dan jenis PMO berhubungan tidak bermakna secara statistik dengan default penderita TB paru. Pengelola TB harus meningkatkan penyuluhan kepada pasien TB bahwa OAT memiliki efek samping, lebih menekankan pentingnya keteraturan berobat dan pengawasan minum obat pada penderita yang tergolong umur tidak produktif.

Kata Kunci : Default TB, Tuberkulosis, RSUD Budhi Asih

ABSTRACT

Name

: Kartika

Study Program

: S1-4 Reguler Epidemiology 2005

Title

:

ANALYSIS OF FACTORS RELATED TO DEFAULT AMONG LUNG TUBERCULOSIS PATIENT AT RSUD BUDHI ASIH JAKARTA 2008

Default is one of the most important things in controlling lung TB. Default causes patients having treatment resistance and it makes them more difficult to be cured. This research determines default proportion among lung TB patient and factors related to it in RSUD Budhi Asih Jakarta 2008 and Cross Sectional is the study design. This research analyses 188 samples from 407 populations.

Statistically, factors that significantly related to default among lung TB patient in RSUD Budhi Asih Jakarta 2008 are treatment side effect and age, while sex, work status, patient type, patients' treatment history, type of treatment side effect, treatment supervisor and it's type are not related to default. TB administrator must reminding all TB patients that TB treatment has side effects and also must reminding those patients about treatment adherence especially to non productive age ones.

Keywords : Tuberculosis, Default Tuberculosis, RSUD Budhi Asih