

Peranan sudut Sgn - Ab sebagai parameter pembantu dalam pengukuran displasia dentokraniofasial Jurusan Anteroposterior (suatu studi awal pada pasien dewasa yang datang ke klinik ortodontik FKG UI dari Januari 1990 sampai dengan Desember 1993)

Andri Anggraeni Wibawaningsasi

Deskripsi Dokumen: <http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=81124&lokasi=lokal>

Abstrak

Penggunaan sudut ANB dan Wits di klinik sebagai metode pengukuran displasia dentokraniofasial jurusan anteroposterior adakalanya memberikan hasil yang berbeda. Hal ini disebabkan adanya pengaruh antara lain variasi posisi Nasion dan kemiringan garis oklusi. Dengan dasar pemikiran bahwa pemakaian lebih dari dua parameter akan memberikan hasil yang lebih baik dan lebih jelas, maka sudut SGN AB yang diperkenalkan oleh Sarhan, dipakai sebagai alat bantu mendiagnosa hubungan mandibula dan maksila ke kranium dalam jurusan anteroposterior.

Penelitian yang merupakan suatu studi awal ini dilakukan pada pasien dewasa yang datang ke klinik ortodontik FKG UI dari bulan Januari 1990 sampai dengan bulan Desember 1993. Tujuannya membuktikan bahwa parameter SGN AB bersama-sama metode sudut ANB dan Wits dapat dipergunakan untuk identifikasi adanya displasia dentokraniofasial jurusan anteroposterior secara lebih baik.

Subjek yang diteliti berupa 70 sefalogram yang terdiri dari 45 wanita dan 25 pria berusia 19-25 tahun, bangsa Indonesia, belum pernah mendapat perawatan ortodontik. Dari setiap subjek diukur sudut SNA, sudut SNB, sudut ANB, sudut SGN AB dan Wits.

Untuk mendapatkan klasifikasi maloklusi, sudut ANB diukur memakai ukuran Steiner yaitu 2° dengan $SD \pm 2^\circ$. Sudut SGN AB diukur menurut norma ukuran Sarhan dan Wits diukur sesuai ukuran Jacobson yaitu 0 mm dengan $SD \pm 1$ mm. Dilakukan pengelompokan klasifikasi maloklusi antara sudut ANB dan Wits, antara sudut SGN AB dan ANB maupun antara sudut SGN AB dan Wits. Kemudian dilihat tingkat ketidakselarasan antara sudut ANB dan Wits, antara sudut SGN AB dan sudut ANB, serta antara sudut SGN AB dan Wits.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat ketidakselarasan antara sudut ANB dan Wits sebesar 24.2 %, dengan kelompok klasifikasi maloklusi yang berbeda sebesar 17 sampel. Pengukuran memakai sudut SGN AB menghasilkan koreksi sudut ANB sebesar 11 sampel, Wits sebesar 6 sampel. Ketidakselarasan antara sudut SGN AB dan sudut ANB sebesar 14 %, dan ketidakselarasan antara sudut SGN AB dan Wits sebesar 10 %. Terlihat bahwa ketidakselarasan antara sudut ANB dan Wits adalah lebih besar dari pada ketidakselarasan antara sudut SGN AB dan sudut ANB maupun antara sudut SGN AB dan Wits.

Secara umum dapat disimpulkan posisi nilai sudut SGN AB yang terletak ditengah-tengah sudut ANB dan Wits, menunjukkan bahwa sudut SGN AB dapat digunakan untuk mengoreksi sudut ANB dan Wits secara seimbang. Dengan demikian sudut SGN AB dapat digunakan sebagai alat bantu yang menunjang keakuratan

pengukuran displasia dentokraniofasial jurusan anteroposterior, disamping metode sudut ANB dan Wits.