

Faktor-faktor yang berhubungan dengan penyalahgunaan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif) di kalangan siswa smu negeri kota bekasi tahun 2002

Raharni

Deskripsi Dokumen: <http://lib.ui.ac.id/bo/uiibo/detail.jsp?id=96918&lokasi=lokal>

Abstrak

Penyalahgunaan napza., merupakan penyakit endemil: dalam masyarakat, penyakit kronik yang berulang kali kambuh dan merupakan proses gangguan mental adiktif Angka kekambuhan cukup tinggi yaitu: sekitar 43,9%. Akibat penyalahgunaan napza banyak fakak yang dirugikan, bukan hanya individu yang bersangclulan, akan tetapi keluarga, masyarakat dan negara_ Masa remaja merupakan masa yang, paling rawan dalam kehidupan seseorang, pada masa ini merupakan masa peraiihan dari masa anak-anak ke rmasa dewasa.

Berdasarkan data dari Rumah sakit Ketergantungan Obat (RSKO) di Jakarta dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 angka kunjungan korban napza untuk pasien rawat inap maupun rawat jalan cenderung mengalami peningkatan. Baik pasien rawat inap maupun rawat jalan sebagian besar berpendidikan SLTA yakni 38% untuk rawat jalan dan 42,5% untuk rawat inap_ Sebagian besar berusia 15 - 24 tahun yaitu sebesar 78,1%_

Tujuan dari penelitian ini adalah diperolehnya informasi tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan penyalahgunaan napza di kalangan siswa SMU negeri kota Bekasi. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengelola kurikulum pendidikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan napza di kalangan siswa SMU. Jenis penelitian ini adalah potong lintang (Cross sectional), populasinya adalah siswa SMU Negeri di kota Bekasi_ Cara pengambilan sampel adalah secara gugus bertahap (Multistage sampling) dan secara acak sederhana, besar sampel dihitung dengan rumus uji hipotesis proporsi tunggal, dengan jumlah sampel 386 siswa_ Cara pengambilan data dilakukan dengan cara survey, pengolahan data menggunakan perangkat komputer, analisis data dilakukan secara univariat, bivariat dengan Uji Chi-Square dan multivariat dengan uji multi regresi logistik ganda, dengan model prediksi. Hasil univariat didapat bahwa responden pria 53,6% dan responden wanita 46,1%, responden: yang berumur kurang dari 17 tahun 22,6% dan yang berumur 17 tahun ke atas 77,4%. Prevalensi pengguna napza di kalangan siswa SMU Negeri kota Bekasi sebesar 16,8%.

Hasil analisis bivariat dengan uji Chi-square di mana $p < 0,05$ diketahui bahwa variabel-variabel yang mempunyai hubungan bermakna dengan penyalahgunaan napza adalah faktor individu yaitu karakteristik remaja (jenis kelamin dan umur), pengetahuan dan sikap, sedangkan dari faktor lingkungan yaitu pekerjaan ibu, keharmonisan keluarga, kebiasaan merokok di keluarga, teman sebaya, dan penggunaan waktu luang. Hasil analisis multivariat dengan uji multi regresi logistik didapat variabel yang paling

dominan berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba adalah jenis kelamin laki-laki. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, disarankan kepada pengelola kurikulum pendidikan perlu segera mencari pemecahan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa SMU, dengan bekerjasama dengan orang tua murid, misalnya. menambahkan kegiatan ekstra kurikuler dan memberikan pelajaran tambahan mengenai narkoba, serta meningkatkan kerja sama secara optimal dengan instansi lain yakni depkes, kepolisian, kekhodaman dengan memberikan penyuluhan tentang penyalahgunaan narkoba mengenai bahaya, akibat dan sanksi penyalahgunaan narkoba. Saran untuk peneliti, perlu dilakukan penelitian selanjutnya yang bersifat kualitatif sehingga paduan kedua jenis penelitian akan sangat bermanfaat sebagai masukan ke Institusi SMU dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa SMU.

Abstract

Drug abuse, an endemic illness on society, is one of those chronic illness which continuously come up and is a process of addictive mental disorder. From the research 49,3% relapse is obtained. It brings terrible effects not only the individual who consumes the drug itself, but also to the family, society, as well as the nation. Adolescence, a transitional time between childhood and adulthood, is the most crucial and dangerous phase in someone's life.

Based on the data obtained from the Hospital of Drug Dependence (RSKO) in Jakarta, on the past 4 years those are 1997 up to 2000, the number of drug abuse patient visit for out patient or the hospitalized ones tends to increase. Both out patients or the hospitalized patients are mostly have high school diploma, those are 38% for out patient and 42,5% for the hospitalized patient. Most of them are 15-24 years of age, estimated at 78,1%.

The purpose of this research is to gather information about factors correlated to drug abuse among government-owned high school students in Bekasi region. It is highly expected that this research can be a source of input for the educational curriculum experts, in preventing drug abuse among high school students to occur.

This research is based on cross sectional method. and the population is government-owned high school students in Bekasi region. both male and female.

Multistage sampling was used, and randomly, sample amount was calculated by single population proportion test method with the amount of 386 students. Data gathering it as completed by survey, data processing was completed by computer, data analysing was completed by univariate, bivariate with Chi-Square test, and multivariate with multi regression logistic test.

53,6% male respondents and 46,1% are the result of univariate. Respondents who are below 17 years old consist of 22,6% and those above 17 years old are 77,4%. Those who had ever tried or are using drugs, are 65 person (16,8%).

The result of bivariate analysis with Chi-square test where $p < 0,05$ determined that variables which have close relation to drug abuse are individual factors teenage

characteristics (gender and age), knowledge and behaviour, and environmental factors, those are mother's occupation, family harmony, smoking habit in the family, peer friends, and the usage of leisure time. The result of multivariate analysis with multiple regression logistic test determined that the most dominant variables correlated to drug abuse is the male gender.

Based on the research result, it is vivid that the educational curriculum experts should immediately seek for the solution to prevent further drug abuse among the high school students. With giving extra curricular activities and giving an extra lesson on drugs. They can also cooperate with other institutions such as Health department, police department, law department in giving brief orientation about drug abuse and its danger, effect, and punishment of misusing drugs. As the advice for researchers, further quality oriented study is highly recommended, so that the combination of both types of research can be very useful as an input for High school institution in the effort of preventing drug abuse among high school students.